非小細胞肺癌　（進行・再発）　1st Line

CDDP+DTX療法+RT

患者ＩＤ：　@PATIENTID　　コース目

患者氏名　：　@PATIENTNAME

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(㎡)
HEIGHT01_Do	HEIGHT01_D	#VALUE!

投与ｽｹｼﾞｭｰﾙ：　１コース　５６日

使用基準：　class Ａ

指示： 体重測定　毎日起床時

注意： Day4以降も水分摂取が少ない場合や尿量が少ない場合には、輸液を考慮すること

《 使　用　薬　剤 》

シスプラチン；（ＣＤＤＰ）：シスプラチン注（50mg/100mL/V、10mg/20mL/V）

ドセタキセル（DTX）：ドセタキセル点滴静注（１Ｖ：20mg、80mg）

投与量：

薬　剤	投与量	計算値	投与量(mg)	投与日
シスプラチン	40 mg/㎡	#VALUE!		1,8,29,36
ドセタキセル	40 mg/㎡	#VALUE!		1,8,29,36

<< タイムスケジュール：開始時刻 >>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

開始日(Day1)；　**1月1日**　（日）　day8　**1月8日**　（日）

day29　**1月29日**　（日）　day36　**2月5日**　（日）

0時00分　①　ソリタＴ３号　500ｍＬ　＋　硫酸Mg補正液　8mL
1時間で点滴静注

1時00分　②　ヴィーンＤ　500ｍＬ
1時間で点滴静注

2時00分　③　生理食塩液 50mL ＋ アロキシ １Ｖ ＋ デキサート 9.9mg
15分で点滴静注

2時15分　④　生理食塩液　250mL　＋　**ドセタキセル（DTX）**　**0mg**
1時間で点滴静注　*0.0mL*

点滴開始から10分間は点滴速度を遅めに設定して、全身状態を観察する。

2時45分　**内服** アプレピタントカプセル 125mg １×（１）シスプラチン開始１時間前頃

3時15分　⑤　20%マンニットール　300ｍＬ
30分で点滴静注

3時45分　⑥　生理食塩液　500mL　＋　**シスプラチン（ＣＤＤＰ）**　**0mg**
90分で点滴静注　*0.0mL*

5時15分　⑦　ソリタＴ３号　500ｍＬ
1時間で点滴静注

6時15分　⑧　ヴィーンＤ　500ｍＬ
1時間で点滴静注

7時15分 終了予定

Day2～3

起床後　**内服** アプレピタントカプセル 80mg １×（２）起床後

REFERENCE

Yoshihiko Segawa,Katsuyuki Kiura,Nagio Takigawa: J Clin Ocnol　2010;28(10):3299-306
Phase III trial comparing docetaxel and cisplatin combination chemotherapy with mitomycin,vindesine,and cisplatin combination chemotherapy with concurrent thoracic radiotherapy in locally advanced non-small-cell lung cancer:OLCSG0007

2011年10月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2011年10月17日 更新:2016年11月17日