大腸癌（進行･再発） 1st、2nd Line

XELOX+Bevacizumab

（　　）コース目

患者ＩＤ：　@PATIENTID

患者氏名　：　@PATIENTNAME

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(㎡)
$HEIGHT01_Doc	$WHEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与ｽｹｼﾞｭｰﾙ：　１コース２１日

使 用 基 準 ：class Ａ　　（２回目以降class Ｂ）

※ ベバシズマブ添付文書及び適性使用ガイドに準じて投与すること。

※ ショック、アナフィラキシー様症状、Infusion reaction発現に要注意。

※ 原則、埋め込み式ポート挿入後は１週間以上、術前後は６週間以上空けて投与すること。

《 使 用 薬 剤 》

ベバシズマブ（BEV）：（ベバシズマブ）　100mg/4mL、400mg/16mL

オキサリプラチン（L-OHP）：オキサリプラチン　５０ｍｇ/Ｖ１００ｍｇ/Ｖ

カペシタビン（CAP）：ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ錠３００ｍｇ

ピリドキサール（VB6）：ピドキサール錠１０ｍｇ

投　与　量　：

薬剤	標準投与量	計算値(mg)	投与量(mg)	投与日
ベバシズマブ	7.5 mg/kg	#VALUE!		1
オキサリプラチン	130 mg/㎡	#VALUE!		1
ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ錠３００mg	Ｃ法に準じる	#VALUE!		1(夕)～15(朝)
ピドキサール錠１０mg	４Ｔ/分２		４Ｔ/分２	1(夕)～22(朝)

ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ1日投与量（Ｃ法）

1.36㎡未満；2400mg、～1.66㎡未満；3000mg、～1.96㎡未満；3600mg、1.96㎡以上；4200mg

《　タイムスケジュール　》

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

Day1　**1月1日**　（金）

0:00　①　生理食塩液 50mL ＋グラニセトロン 1A ＋デキサート 13.2mg
15分で点滴静注

0:15　②　生理食塩液 100mL ＋ ベバシズマブ　*mg*
90 分投与　　0.0 mL
（初回は90分、２回目以降は60分・30分に変更可）

1:45　③　５%ブドウ糖液 ５００mL ＋ **オキサリプラチン注**　*mg*
２時間で点滴静注

3:45　④　生理食塩液 50mL
フラッシュ

※　内服薬は1日目夕食後より内服開始

Day1(夕)～15(朝)　内服①　ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ錠 300mg　**0** 錠　朝･夕食後

Day1(夕)～22(朝)　内服②　ピドキサール錠10mg　**4** 錠　朝･夕食後

REFERENCE

Leonard B. Saltz, Stephen Clarke, Eduardo Dias-Rubio, et al: J Clin Oncol 26：2013-2019, 2008

Bevacizumab in combination with oxaliplatin-based chemotherapy as first-line therapy in metastatic colorectal cancer

：A randomized phase Ⅲ study

第10回化学療法プロトコール審査委員会承認：2009年10月28日、更新：2017年6月1日