前立腺癌
Degarelix療法

（　　）コース目

患者ＩＤ：　@PATIENTID

患者氏名　：　@PATIENTNAME

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(㎡)
$HEIGHT01_Doc	$WHEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与ｽｹｼﾞｭｰﾙ：　１コース 28日

使 用 基 準： 前立腺癌

※初回投与：240mgを初回投与量とし、1ヶ所あたり120mgずつ腹部2ヶ所に皮下投与。

※2回目以降：80mgを維持投与量とし、腹部1ヶ所に皮下投与。

※投与液濃度、投与量が有効性に影響するため、調製方法を遵守すること。

《使 用 薬 剤》

デガレリクス：ゴナックス皮下注用（１V：80mg、120mg）

「ゴナックス皮下注用の調製と注射方法」に従い使用すること

※　ルアーロックシリンジ、21G、25Gの注射針を使用すること。

※　調製時にバイアルを**激しく振ったり逆さにしない。**

※　吸引時もバイアルを**逆さ**にしない。

※　調製後は**直ちに投与**する。(1時間以上放置することで、懸濁、粘度増加)

投与量：

薬　剤	初回投与量	維持投与量	投与量(mg)
ゴナックス	240mg/body	80mg/body	240

<<　タイムスケジュール：開始時刻　>>

day1　**7月12日**　（月）　**10時00分**　①　注射用水＋ゴナックス　**240mg**

腹部に皮下注射

※腹部以外の部位（ベルト周り等圧迫される部位及び肋骨近辺を避けること！）、同じ部位への反復投与も避けること！

REFERENCE

Laurence Klotz, Laurent Boccon-Gibod, Neal D.Shore et al;Journal Compilation 2008 BJU International 102,1531-1538

The efficacy and safety of degarelix: a 12-month, comparative , rando,oized, open-label, parallel-group phase Ⅲ study in patients with prostate cancer

Seiichiro Osono,Takeshi Ueda,Senji Hoshi et al;Jpn J Clin Oncol 2012 42(6)477-484

The efficacy and safety of degarelix,a GnRH Antagonist: A 12-month,multicentre,randomized,mainteance dose-finding phase Ⅱ study in Japanese patients with prostate cancer

2012年12月度化学療法プロトコール審査委員会承認：2012年12月10日