低悪性度リンパ腫　　再発･再燃または治療抵抗性

Cladribine療法

（ 1 ）コース目

患者ＩＤ：　@PATIENTID

患者氏名　：　@PATIENTNAME

身長(cm)	体重(kg)	体表面積(m²)
$HEIGHT01_Doc	$WHEIGHT01_Doc	#VALUE!

投与ｽｹｼﾞｭｰﾙ　：　１コース 28日

使 用 薬 剤　：クラドリビン（２-CdA）：クラドリビン　8ｍｇ／8mL／V

使 用 基 準　：class B

投与量：

薬　　剤	標準投与量	計算値(mg)	投与量(mg)	投与日
クラドリビン	0.12 mg/kg	#VALUE!		1～5

<<　タイムスケジュール：開始時刻　>>

※記載している時刻は例です。当日の投与予定時刻ではありませんのでご注意ください。

day1～5　**5月10日**　（月）　～　**5月14日**　（金）

0時00分　①　生理食塩液 50mL ＋ グラニセトロン 1A
15分かけて点滴投与

0時15分　②　生理食塩液 500mL ＋ クラドリビン　.mg
2時間かけて点滴投与

2時15分　③　生理食塩液 50mL
フラッシュ

REFERENCE

Kensei Tobinai,Takashi Watanabe,Kazuki Tanimoto et al：Cancer Sci　(2009) 100, 1344-1350
Phase Ⅰ/Ⅱ and phaemacokinetic study of cladribine with 2-h infusion in Japanese patients with relapsed indolent B-cell lymphoma mostly pretreated with rituximab

2011年9月度プロトコール審査委員会承認：2011年9月12日　更新:2016年2月8日